



109. Vì sao trong chăn nuôi gà, để trống chuồng là biện pháp cách ly quan trọng?

♦ Trong chăn nuôi gà, để trống chuồng là biện pháp cách ly quan trọng, vì:

- Một số mầm bệnh có khả năng tồn tại lâu trong môi trường chăn nuôi (Xem bảng dưới đây), thậm chí sau khi chuồng nuôi đã được dọn dẹp, vệ sinh và khử trùng;
- Thời gian trống chuồng sẽ hỗ trợ tiêu diệt mầm bệnh vì lúc này trong chuồng không có gà là môi trường thiết yếu cho mầm bệnh phát triển. Không có gà, mầm bệnh sẽ không còn môi trường để sinh sôi, phát triển.

Do đó, trống chuồng là biện pháp cách ly về thời gian rất quan trọng nhằm tiêu diệt mầm bệnh, cắt đứt đường lây truyền bệnh.



Hình 42. Để trống chuồng nuôi sau khi vệ sinh và khử trùng

Thời gian tồn tại của một số mầm bệnh ngoài cơ thể sống

STT	Mầm bệnh	Thời gian tồn tại ngoài cơ thể
1	Vi rút gây bệnh Gumboro	Vài tháng
2	Vi rút gây bệnh cúm gia cầm	Vài tuần
3	Vi rút gây bệnh Niu-cát xơ	Vài giờ đến vài tuần
4	Vi rút gây bệnh viêm thanh khí quản truyền nhiễm	Vài tuần
5	Vi rút gây bệnh Marek	Vài tuần
6	Vi khuẩn gây bệnh sổ mũi truyền nhiễm	Vài giờ đến ngày
7	Vi khuẩn gây bệnh tụ huyết trùng	Vài tuần
8	Vi khuẩn gây bệnh thương hàn	Vài tuần
9	Noãn nang cầu trùng	Vài tháng

Thời gian để trống chuồng tối thiểu là 2 tuần.