



31. Nguyên nhân làm gà con còi cọc, chậm lớn, chết rải rác trong tuần đầu là gì? Cách phòng ngừa thế nào?

Nguyên nhân	Giải pháp phòng ngừa
1. Chất lượng gà con không đảm bảo: Gà con nở ra từ trứng của đàn sinh sản mới vào đẻ hoặc quá già Cơ sở ấp trứng không thực hiện tốt quy trình kỹ thuật, an toàn sinh học trong ấp nở gia cầm Một số gà con nở sớm hoặc vận chuyển xa đã bị mất nước Một số gà con bị nhiễm bệnh từ bố mẹ, lò ấp hoặc từ vận chuyển	Chỉ mua gà con từ đàn sinh sản đủ tiêu chuẩn làm giống và có bảo hành Chỉ mua gà con từ cơ sở ấp trứng thực hiện tốt quy trình kỹ thuật, an toàn sinh học trong ấp nở và vận chuyển gà con
2. Nuôi dưỡng, chăm sóc không đúng, không tốt: Gà con bị nhiễm độc tố nấm mốc từ chất độn chuồng, thức ăn nhưng ở mức thấp Gà con ăn nhầm chất độn chuồng, đặc biệt là trấu Thức ăn không đảm bảo chất lượng như thiếu dinh dưỡng, bị mốc, bị mặn Không đủ khay ăn, máng uống Thiếu nhiệt/ thừa nhiệt trong quây úm Quây quá kín cả xung quanh và trên quây úm để giữ nhiệt dẫn đến gà con bị ngạt vì thừa khí thải và thiếu oxy Ống thoát khí của bếp than bị hở ngay trong quây úm, chuồng úm Điều trị kháng sinh quá liều, kéo dài Gà bị bệnh	Chất độn chuồng phải khô, mới, sạch; thức ăn phải tươi, mới, sạch Hạn chế sử dụng trấu. Cho ăn đầy đủ và tránh để thức ăn rơi vãi Sử dụng thức ăn chất lượng tốt cho gà con Đủ khay ăn, máng uống theo quy định (<i>Xem câu 33, 40</i>) Đảm bảo nhiệt độ thích hợp cho gà con trong quây úm (<i>Xem câu 33, 35</i>). Quây kín xung quanh để giữ nhiệt nhưng phải để thông thoáng phía trên quây úm giúp trao đổi khí và thoát khí thải Không để khí bếp than rò rỉ trong quây úm Hạn chế sử dụng kháng sinh; sử dụng kháng sinh đúng liều và liệu trình Thực hiện tốt an toàn sinh học, nuôi dưỡng, chăm sóc tốt, sử dụng đầy đủ vắc-xin phòng bệnh cho gà theo lịch trình khuyến cáo